

17.6. Vómitos

El **vómito** es la expulsión brusca del contenido del estómago por la boca. Suele estar precedido por náuseas y dolor de estómago.

La causa más frecuente son las infecciones del estómago e intestino por virus (gastroenteritis). En los niños puede suceder también en muchas otras enfermedades como catarros, dolor de garganta, otitis, etc. En ocasiones pueden deberse a una enfermedad de mayor gravedad.

Muchas veces los vómitos se acompañan de diarrea.

Habitualmente duran poco tiempo y desaparecen sin tratamiento. Sin embargo, en los niños hay que tomar precauciones especiales, porque con los vómitos se pierden agua y sales del cuerpo y ello puede producir **deshidratación**, sobre todo si hay diarrea y el niño es un lactante.

¿Qué puede hacer?

- No fuerce al niño a comer. Si no tiene apetito ofrézcale sólo líquidos. El niño no debe dejar de beber para compensar las pérdidas por los vómitos.
- Para beber, utilice «sueros» de farmacia: **líquidos de rehidratación oral**, que contienen agua y sales. Se pueden preparar en casa diluyendo 1 sobre en 1 l de agua que no esté hervida. Sabe mejor si se añaden unas gotas de limón y está fresca (guárdela en el frigorífico).
- Después de vomitar, no le dé nada (ni agua) durante 15-30 minutos. *Más tarde déle de beber pequeños sorbos de líquido: 1-2 cucharaditas cada 10-15 minutos. Si el niño tiene sed y le pide más, siga con pequeños sorbos y humedézcale los labios con una gasa mojada o con un cubito de hielo.*
- Si no vomita en 2-3 horas, aumente la cantidad de líquido lentamente, y déle el alimento que le apetezca en pequeñas cantidades, sin forzarlo.
- Inicie la alimentación con una dieta blanda (sopa, hervidos, zumos naturales). Evite los alimentos grasos y con mucho azúcar.
- Si no ha vomitado en 24 horas puede empezar su dieta habitual.
- **En niños lactantes** que vomitan la toma completa, debe continuar la lactancia dando un solo pecho y reduciendo el tiempo de mamar a 5-10 minutos, pero haciéndolo cada 2 horas. Si a las 6-8 horas no vomita, puede pasar a la lactancia normal con los dos pechos.
- **No le dé medicamentos para los vómitos**, excepto si su médico se lo indica.
- Tanto el niño como la persona que lo cuida **deben lavarse bien las manos**, especialmente los dedos y las uñas. Los niños con vómitos por infecciones intestinales pueden contagiar a otros. Evite el contacto con otros niños mientras tenga vómitos.
- Si tiene **fiebre** le puede dar **paracetamol** a las dosis que le aconseja su médico habitualmente



¿Cuándo consultar a su médico de familia?

- Si presenta más de 38 °C de fiebre.
- Si está muy decaído, cuesta despertarlo o si está irritable.
- Si no quiere beber.
- Si tiene menos de 3 meses y vomita las tomas.
- Si hay sangre en el vómito o en las heces.
- Si el vómito tiene aspecto de café molido.
- Si tiene la boca seca, llora sin lágrimas y orina poco.
- Si tiene dolor de cabeza, en el cuello o le aparecen manchas en el cuerpo.
- Si vomita todos los líquidos, a pesar de dárselos a pequeños sorbos.
- Si presenta dolor de barriga persistente.
- Si sospecha que puede haber tomado algún producto tóxico o medicamento.

¿Dónde conseguir más información?

- <http://www.aeped.es/infamilia/temas/gea.htm>
- <http://www.aepap.org/faqpad/faqpad-vomito.htm>
- <http://www.aepap.org/faqpad/faqpad-GEA.htm>